De qué Manera Afecta el Alcohol el Mundo de un Niño

HÁGASE ESTAS PREGUNTAS

Como padres

- ¿Sabe cómo hablar sobre el consumo de alcohol con sus hijos y en dónde obtener información que le puede ayudar?
- ¿Conoce a los amigos de sus hijos? ¿Cree que tienen una influencia positiva en las actividades de sus hijos?
- ¿Sabe a qué grado beben alcohol los niños de su comunidad y cómo encontrar organizaciones locales que están trabajando en este problema?
- ¿Sabe cuáles son las consecuencias legales si descubren a su hijo bebiendo alcohol?
- ¿Sabe cuáles son las leyes de su estado en cuanto a proveer alcohol a una persona menor de 21 años?

Como maestros, administradores y consejeros escolares

- ¿Su escuela o comunidad ha evaluado hasta qué punto los estudiantes beben alcohol a fin de determinar la dimensión del problema?
- ¿Sabe qué factores podrían estar contribuyendo a que los estudiantes beban alcohol en su escuela o comunidad? (Por ejemplo, la facilidad con que se obtiene el alcohol, la presión de los compañeros, la incapacidad de los adultos para enfrentar el problema.)
- ¿Sabe si se están tomando medidas dentro de su sistema escolar para ayudar a los niños a resistir la presión de beber alcohol? ¿Cuáles son esas medidas?
- Actualmente, ¿está trabajando su escuela para informar a los padres sobre el consumo de alcohol entre menores?
- ¿Tiene su escuela una sociedad activa con las familias de sus estudiantes?

Como ciudadanos interesados

- ¿Sabe que tan fácil pueden obtener alcohol los niños de su comunidad y lo que pueden hacer las comunidades para prevenir que los jóvenes tengan acceso al alcohol?
- ¿Su comunidad tiene programas y políticas educativas para prevenir que los menores de edad beban alcohol?
- ¿Su comunidad ofrece actividades “libres de alcohol” para familias? De no ser así, ¿sabe cómo organizarlas?
- ¿Hay colaboración entre escuelas públicas y privadas, negocios de la comunidad, el gobierno local y la fuerza policiaca para crear y hacer cumplir políticas relacionadas con el consumo de alcohol de los jóvenes?

Para obtener información sobre cómo prevenir que los niños consuman alcohol, envíe un mensaje electrónico a Leadership to Keep Children Alcohol Free a: Leadership@alcoholfreechildren.org.

LA FAMILIA

"He visto lo que el alcohol le ha hecho a mi familia y con eso tengo para toda la vida. Jamás tomaré alcohol." —Mateo, Michigan

- Casi 17% de los niños menores de 14 años y 20% de los niños menores de 18 años viven con uno de sus padres (o con un adulto responsable) que bebe demasiado o que tiene problemas con el alcohol.[1]
- Las investigaciones más recientes sugieren que hay menos probabilidades de que los niños beban alcohol si los padres forman parte de sus vidas y participan en sus actividades y cuando tanto los niños como los padres indican que tienen una relación estrecha.[2, 3]
- Los adolescentes beben menos y tienen menos problemas relacionados con el alcohol cuando los padres aplican una disciplina uniforme y expresan sus expectativas claramente.[2]
- Los hijos de padres alcohólicos tienen más probabilidades de empezar a tomar durante su adolecencia y a desarrollar desórdenes de uso de alcohol.[4]
- La forma en que los padres beben alcohol y sus actitudes favorables hacia la bebida están asociadas con el hecho de que sus hijos adolescentes comiencen a beber alcohol y continúen haciéndolo.[2, 5, 6]
- Beber alcohol durante el embarazo se ha asociado no solamente con el síndrome alcohólico fetal sino también con problemas de aprendizaje y conducta de los hijos que les siguen afectando hasta la adolescencia.[7]

[1] Alcohol Epidemiologic Data System, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. [Number of children living with parent who has alcohol problem.] Unpublished data, 1999. Based on National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism *1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey*.

[2] Hawkins, J.D., et al. Exploring the effects of age of alcohol use initiation and psychosocial risk factors on subsequent alcohol misuse. *Journal of Studies on Alcohol* 58(3):280-290, 1997.

[3] Resnick, M.D., et al. Protecting adolescents from harm: Findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. *Journal of the American Medical Association* 278(10):823-832, 1997.

[4] National Institute on Alcohol and Alcoholism. Youth Drinking: Risk Factors and Consequences. Alcohol Alert No. 37, July 1997.

[5] Andrews, J.A., et al. Parental influence on early adolescent substance use: Specific and nonspecific effects. *Journal of Early Adolescence* 13(3):285-310, 1993.

[6] Ary, D.V., et al. The influence of parent, sibling, and peer modeling and attitudes on adolescent use of alcohol. *International Journal of the Addictions* 28(9):853-880, 1993.

[6] Cotton, N.S. Familial incidence of alcoholism: A review. *Journal of Studies on Alcohol* 40:89-116, 1979.

[7] Olson, H.C., et al. Association of prenatal alcohol exposure with behavioral and learning problems in early adolescence. *Journal of the American Academy of Child and Adolescen Psychiatry* 36(9):1187-1194, 1997.

LA COMUNIDAD

"El alcohol es la droga preferida de los jóvenes de este país. No obstante, el público en general y los legisladores parecen no darse cuenta de la seriedad de esta situación." — Dr. Enoch Gordis, Director, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

- A la gran mayoría de los estadounidenses (96%) le preocupa que los menores de edad beban alcohol y una mayoría apoya medidas que ayudarían a reducir el consumo de alcohol entre adolescentes, por ejemplo, un control más estricto de las ventas, la publicidad y la promoción de alcohol.[1]
- En Estados Unidos, los gastos de publicidad recientes dedicados a promover cerveza, vino y bebidas alcohólicas fuertes en conjunto ($1.2 mil millones) fueron más de 10 veces más altos de lo que se gastó en anuncios de leche ($70.5 millones). Un total de $764.2 millones de dólares se gastó en anuncios de cerveza, $131.5 millones en anuncios de vino y $291.2 millones en anuncios de bebidas alcohólicas fuertes.[2, 3]
- Un estudio realizado con estudiantes de quinto y sexto grado determinó que los jóvenes que demostraron estar conscientes de los anuncios de cerveza también tenían actitudes más favorables hacia el consumo de alcohol y tenían la intención de beber más frecuentemente cuando tuvieran más edad.[4]
- Un estudio realizado en los estados de la región central de Estados Unidos determinó que 46% de los estudiantes de noveno grado que dijeron haber bebido alcohol durante el mes anterior al estudio indicaron que obtuvieron el alcohol de una persona mayor de 21 años.[5]
- En un estudio realizado en 38 estados y en el Distrito de Columbia, las zonas que tienen un mayor número de establecimientos donde se vende alcohol también tienen índices más altos de alcoholismo.[6]
- La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras de EE.UU. calcula que las leyes que establecen 21 años como la edad mínima para consumir alcohol ha salvado 19,121 vidas desde a mediados de los años 70's.[7]
- Es tres veces más probable que entre los conductores de entre 15 y 20 años de edad, los accidentes automovilísticos fatales nocturnos en los que sólo hay un auto involucrado tengan que ver con el alcohol que otros accidentes fatales.[8]

[1] Wagenaar, A.C., et al. *The Robert Wood Johnson Foundation Youth Access To Alcohol Survey: Summary.* Minneapolis: University of Minnesota, Alcohol Epidemiology Program, 1998.

[2] Adams Business Media. *Liquor handbook 1999.* New York: Author, 1999; Adams Business Media. *Wine handbook 1999.* New York: Author, 1999; & Adams Business Media. *Bee handbook 1999*. New York: Author, 1999.

[3] Blisard, N., et al. *Analyses of Generic Dairy Advertising, 1984-97*. Technical Bulletin No. 1873. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Food and Rural Economics Division, Economic Research Service. March 1999. (p.10)

[4] Grube, J.W., & Wallack, L. Television beer advertising and drinking knowledge, beliefs, and intentions among schoolchildren. *American Journal of Public Health* 84(2):254-259, 1994.

[5] Wagenaar, A.C., et al. Sources of alcohol for underage drinkers. *Journal of Studies on Alcohol* 57(3):325-333, 1996.

[6] Harford, T.C., et al. Relationship between the number of on-premise outlets and alcoholism. *Journal of Studies on Alcohol* 40(11):1053-1057, 1979.

[7] National Highway Traffic Safety Administration. *Traffic Safety Facts 1998—Alcohol*. Washington, DC: U.S. Department of Transportation.

[8] Hingson, R., et al. Lower legal blood alcohol limits for young drivers. *Public Health Reports* 109(6):738-744, 1994.

LOS NIÑOS

"Los padres deben entender que ellos son la primera línea de defensa cuando se trata de criar a niños sanos." —Peggy Sapp, Presidenta, National Family Partnership

- El setenta y cinco por ciento de los estudiantes de noveno grado y el 89% del décimo grado creen que el alcohol está inmediatamente disponible para su propio consumo.[1]
- El cuarenta por ciento de los estudiantes de noveno grado dijeron haber bebido alcohol antes de cumplir los 13 años de edad. [2] En comparación, solamente 27% de los estudiantes de noveno grado dijeron haber fumado cigarrillos y 13% haber fumado marihuana antes de cumplir los 13 años de edad.[2]
- El cuarenta y uno por ciento de los estudiantes de noveno grado dijeron haber bebido en el último mes, mientras que solamente 28% dijo haber fumado en el último mes previo a la encuesta.[3]
- Casi la tercera parte de los estudiantes del octavo grado y casi la mitad de los del decimo grado han estado borracho por lo menos una vez.[1]
- Una quinta parte de los estudiantes de noveno grado dijeron haber bebido en grandes cantidades (haber tomado cinco o más bebidas en una sola ocasión) durante el mes anterior a la encuesta.[4]
- El índice de consumo de alcohol varía entre los diferentes grupos minoritarios raciales y étnicos. Entre los estudiantes de noveno grado que beben grandes cantidades de alcohol en una sola ocasión, se reporta que el 27% son estudiantes blancos no hispanos; el 30% son estudiantes hispanos; el 15% son estudiantes afro-americanos y el 5% son estudiantes asiáticos o de las islas del Pacífico.[3]
- La diferencia en el consumo de alcohol entre niños y niñas ha desaparecido. Entre los estudiantes de noveno grado, las niñas consumen alcohol en grandes cantidades en la misma proporción que los niños.[2]
- Más del cuarenta por ciento de las personas que comienzan a beber alcohol antes de cumplir los 13 años se volverán alcohólicos o dependerán del alcohol en algún momento de sus vidas.[4]
- Si la edad en la que comienzan a beber se posterga 5 años, el riesgo de que el menor tenga problemas graves relacionados con el alcohol se reduce en un 50%.[5]

[1] Johnston, L.D. et al. National survey on drug use from the Monitoring the Future Study, 1995-1997. Volume I: Secondary school students, Rockville, MD. National Institute on Drug Abuse, 1998.

[2] Centers for Disease Control and Prevention. Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 1997. *Morbidity and Mortality Weekly Report: CDC Surveillance Summaries* 47(No. SS-3):1-89.

[3] Alcohol Epidemiologic Data System, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. [Racial/ethnic breakdown of youth alcohol rates.] Unpublished data, 1999. Based on Centers for Disease Control and Prevention *Youth Risk Behavior Surveillance, 1997*.

[4] Grant, B.F., & Dawson, D.A. Age at onset of alcohol use and association with DSM-IV alcohol abuse and dependence: Results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. *Journal of Substance Abuse* 9:103-110, 1997.

[5] Calculated from information contained in : Grant, B.F., & Dawson, D.A. Age at onset of alcohol use and association with DSM-IV alcohol abuse and dependence: Results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. *Journal of Substance Abuse* 9:103-110, 1997.

LA ESCUELA

"El alcohol casi destruye mi vida. Comencé bebiendo con mis amigos, tratando de ser "cool", estar "en onda". Bebía para emborracharme e… hice cosas estúpidas cuando estaba borracha. Ahora estoy tratando de recuperar mi vida, pero no es fácil cuando se tiene un bebé." —Amy, Colorado

- Las evidencias sugieren que el hecho de que los compañeros de un adolescente consuman alcohol es un sólido indicador de que él o ella beberá alcohol.[1]
- De acuerdo con una encuesta realizada a nivel nacional en 1995 los de estudiantes de cuarto a sexto grado que leen la publicación *Weekly Reader*, el 30% de los estudiantes dijeron que se sentían "muy" presionados por parte de sus compañeros de clase para que bebieran cerveza.[2]
- De acuerdo a la misma encuesta de la Weekly Reader realizada en 1995, mas de la mitad (54%) de los estudiantes de entre cuarto y sexto grado dijeron haber aprendido en la escuela acerca de los peligros de las drogas ilícitas, sin embargo menos de un tercio (30%) aprendieron en la escuela acerca de los peligros de tomar y fumar.[2]
- Entre los estudiantes del octavo grado, los estudiantes con promedios de calificación más altos informaron que consumieron menos alcohol durante el mes anterior al estudio.[3]
- Las investigaciones indican que los adolescentes que abusan del alcohol recuerdan 10% menos, lo que aprendieron, que aquellos adolescentes que no toman.[4]
- Entre los estudiantes de octavo grado, los índices de ausentismo escolar más altos estuvieron relacionados con índices de consumo de alcohol más altos durante el mes anterior al estudio.[3]
- Los resultados de un estudio nacional indicaron que es menos probable que los estudiantes consuman alcohol si tienen una relación cercana con personas en la escuela, si sienten que forman parte de la escuela y que los maestros tratan a los estudiantes de forma justa.[5]
- En una encuesta hecha con maestros de séptimo a doceavo grado, el 76% de los entrevistados dijeron que el problema del consumo de alcohol entre menores de edad era serio o más o menos serio.[6]

[1] Hawkins, J.D., et al. Exploring the effects of age of alcohol use initiation and psychosocial risk factors on subsequent alcohol misuse. *Journal of Studies on Alcohol* 58(3):280-290, 1997.

[2] *The Weekly Reader National Survey on Drugs and Alcohol*, Middletown, CT: Field Publications, Spring 1995.

[3] O'Malley, P.M., et al. Alcohol use among adolescents. *Alcohol Health & Research World* 22(2):85-93, 1998.

[4] Brown, S.A. et al. Neurocognitive functioning of adolescents : effects of protracted alcoholism Clinical and Experimental Research 24(2) :164-171.

[5] Resnick, M.D., et al. Protecting adolescents from harm: Findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. *Journal of the American Medical Association* 278(10):823-832, 1997.

[6] Metropolitan Life/Louis Harris Associates, Inc. *The Metropolitan Life Survey of the American Teacher, 1984-1995*. Cited in Department of Education. *Digest of Education Statistics 1996.* Washington, DC: National Center for Education Statistics, 1996.

EL IMPACTO EN LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

"El consumo de alcohol de menores de edad es una grave amenaza a la salud y seguridad de nuestros niños. Ha llegado el momento de que hagamos frente a este extenso y devastador problema de salud pública." —Dr. Steven A. Schroeder, Presidente/Director Ejecutivo, The Robert Wood Johnson Foundation

- En una encuesta realizada en 1999, el 31% de los estudiantes de noveno grado dijeron haber viajado en un vehículo conducido por alguien que había estado tomando bebidas alcohólicas. Casi el 5% de los estudiantes de noveno grado dijeron haber conducido una o más veces mientras estaban tomando bebidas alcohólicas.[1]
- De todos los niños menores de 15 años de edad que murieron en accidentes automovilísticos en 1998, 20% de ellos murieron en accidentes relacionados con el alcohol.[2]
- Entre jóvenes de 12 a 17 años de edad que beben alcohol actualmente, 31% tenían niveles extremadamente altos de angustia psicológica y 39% presentaron serios problemas de conducta.[3]
- En 1997, los suicidios y homicidios representaron casi el 16% de todas las muertes entre niños de 9 y 15 años de edad.[4] Veintiocho por ciento de los suicidios y 46% de los homicidios se pueden atribuir al consumo de alcohol.[5]
- En una muestra nacional representativa de jóvenes de 12 a 16 años de edad que beben alcohol actualmente, se determinó que estos jóvenes tenían niveles más altos de presión diastólica que los jóvenes de la misma edad que no consumen alcohol.[6]
- Las adolescentes que beben mucho alcohol asumen los mismos riesgos de salud, a largo plazo, que los adultos que beben en grandes proporciones.[7]
- Las niñas entre 12 y 16 años de edad que en ese momento consumían alcohol tenían cuatro veces más probabilidades de sufrir de depresión que las niñas de la misma edad que no bebían.[8]
- Las adolescentes que beben, muestran más altos niveles de estradiol (un estrógeno) y testosterona que las jóvenes que no beben. Los niveles altos de estrógeno podrían contribuir al aumento en el riesgo de sufrir enfermedades específicas, entre ellas el cáncer de seno, y los altos niveles de testosterona están asociados con un aumento en el riesgo de consumo de drogas y alcohol.[9]

[1] Centers for Disease Control and Prevention.. Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 1999. *Morbidity and Mortality Weekly Report: CDC Surveillance Summaries* 49(No. SS-5):1-94, 2000.

[2] National Highway Traffic Safety Administration. *Traffic Safety Facts 1998—Children*. Washington, DC: U.S. Department of Transportation, 1999.

[3] Substance Abuse and Mental Health Services Administration. *The Relationship Between Mental Health and Substance Abuse Among Adolescents.* Rockville, MD: Author, 1999.

[4] Calculated from the Multiple Cause of Death Public Use Data File, National Center for Health Statistics, 1997.

[5] Calculated by applying alcohol-attributed fractions for individuals older than 15, found in National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. State Trends in Alcohol Mortality, 1979-1992. U.S. Alcohol Epidemiologic Data Rereference Manual, Volume 5. Rockville, MD: NIAAA, 1996.

[6] Hanna, E.Z. et al. *Drinking, smoking, and blood pressure: Do their relationships among youth foreshadow what we know among adults?* Paper presented at the American Public Health Association Annual Meeting, Chicago, IL, November, 1999.

[7] Alcohol Health and Research World, Volume 17, No.2. Rockville, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 1993.

[8] Hanna E.Z., et al. The relationship of drinking alone and other substance use alone in combination to health problems among youth aged 12-16; Findings from the Third National Health and Nutrition Survey (NHANES III). Paper presented at the 23rd Annual Scientific Meeting of the Reaserch Society on Alcoholism, June 24-29, 2000, Denver, CO.

[9] Martin C.A., et al. Alcohol use in adolescent females: Correlates of estradiol and testosterone. *American Journal on Addiction* 8(1):9-14, 1999.

EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD

- Aproximadamente 14 millones de estadounidenses —es decir, casi 7.4% de la población adulta— cumple con los criterios del diagnóstico de abuso de alcohol o alcoholismo.[1]
- Más de la mitad de los adultos estadounidenses tienen un pariente cercano que sufre o ha sufrido de alcoholismo.[2]
- El costo total que se atribuye a las consecuencias por consumo de alcohol de menores es más de $58 mil millones de dólares al año en 1998.[3]
- En 1998, el costo anual estimado del abuso de alcohol en EE.UU. ascendió a $185 mil millones de dólares. Los trastornos causados por el consumo de alcohol costaron $56.7 mil millones de dólares más que el costo económico anual estimado del consumo de drogas ilícitas y $36.5 mil millones más que el costo económico anual estimado de fumar.[4,5]
- En 1992, las pérdidas estimadas de productividad de los empleados que sufren o sufrieron de alcoholismo fue de $66.7 mil millones de dólares. Las pérdidas de productividad fueron mayores en hombres que comenzaron a consumir alcohol antes de los 15 años de edad.[4]
- En un estudio, casi 60% de las personas entre 18 y 24 que actualmente beben alcohol y que no terminaron la escuela secundaria (high school) comenzaron a beber antes de los 16 años de edad.[6]
- En 1996, una persona estadounidense promedio bebió 32 galones de cerveza en comparación con 52 galones de refrescos, 24 galones de leche y 23 galones de café.[7]
- Los hombres adultos que toman más de dos bebidas alcohólicas al día corren mayor riesgo de sufrir de cáncer, enfermedades cerebro-vasculares, accidentes y violencia.[8]
- El uso exagerado de alcohol a largo plazo, es una de las causas principales de trastornos y muertes por enfermedades del hígado, en los Estados Unidos.[8]
- El alcohol está implicado en más de 100,000 muertes al año.[9]
- En 1996, aproximadamente 2 millones (38%) de los estimados 5.3 millones delincuentes condenados a prisión bajo la jurisdicción de entidades correccionales habían estado bebiendo cuando cometieron el delito.[10]

[1] Grant B.F., et al. Prevalence of DSM-IV alcohol abuse and dependence: United States, 1992. *Alcohol Health & Research World* 18(3):243-248, 1994.

[2] Dawson, D.A., & Grant, B.F. Family history of alcoholism and gender: Their combined effects on DSM-IV alcohol dependence and major depression. *Journal of Studies on Alcoho* 59(1):97-106, 1998.

[3] Pacific Institute for Research and Evaluation. *Costs of Underage Drinking*. Updated edition. Prepared for the Office for Juvenile Justice and Delinquency Prevention National Leadership Conference, July 11-14, 1999, Reston, VA. In support of the OJJDP Enforcing the Underage Drinking Laws Program under contract 98-AH-F8-0114.

[4] Updated estimate based on draft report prepared for NIAAA by the Lewin Group, October 1999. Underlying estimates reported in Harwood, H., et al. *The Economic Costs of Alcohol and Drug Abuse in the United States, 1992.* Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse, 1998.

[5] U.S. Department of the Treasury. *The Economic Costs of Smoking in the United States and the Benefits of Comprehensive Tobacco Legislation.* Washington, DC: Author, 1998.

[6] National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. *Drinking in the United States: Main Findings from the 1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES).* U.S. Alcohol Epidemiologic Data Reference Manual, Volume 6. Bethesda, MD: Author, 1998.

[7] U.S. Census Bureau. *Statistical Abstract of the United States, 1998* (118th ed.). Washington, DC: Author, 1998.

[8] National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. 10th Special Report to the U..S. Congress on Alcohol and Health. Rockville, MD: NIAAA, June 2000.

[9] McGinnis, J.M., & Foege, W.H. Actual causes of death in the United States. *Journal of the American Medical Association* 270(18):2207-2212, 1993.

[10] U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. *Alcohol and Crime: An Analysis of National Data on the Prevalence of Alcohol Involvement in Crime.* (NCJ-168632). Washington, DC: Author, 1998.

EL ALCOHOL NO ES UNA BEBIDA PARA LOS NIÑOS

El programa *Leadership to Keep Children Alcohol Free (Liderazgo para Mantener a los Niños Libres del Alcohol)* una coalición única de esposas ó esposos de gobernadores(as), agencias federales, y organizaciones públicas y privadas, es una iniciativa nacional para prevenir el uso de alcohol entre los niños de 9 a 15 años de edad.

- El alcohol es la droga de primer escogencia entre los jóvenes de nuestra nación.

- Los estudios indican que los adolescentes que abusan del alcohol pueden recordar 10% menos de lo que han aprendido que aquellos que no consumen alcohol.

- Más de 40% de las personas que comienzan a beber antes de cumplir los 13 años de edad, desarrollarán abuso o dependencia del alcohol en algún punto de sus vidas.

- Case un tercio de los estudiantes de octavo grado y la mitad de los estudiantes de décimo grado han estado borrachos, por lo menos una vez. Una quinta parte de los estudiantes de noveno grado dicen haber tomado en exceso (tomando cinco o más tragos cada vez) en el último previo a la encuesta.

LIDERAZGO PARA MANTENER A LOS NIÑOS LIBRES DEL ALCOHOL

El programa *Leadership to Keep Children Alcohol Free (Liderazgo para Mantener a los Niños Libres del Alcohol)* una coalición única de esposas ó esposos de gobernadores(as), agencias federales, y organizaciones públicas y privadas, es una iniciativa nacional para prevenir el uso de alcohol entre los niños de 9 a 15 años de edad. Es el único esfuerzo nacional que se enfoca en grupos de esta edad. El abuso del alcohol empieza a una edad muy temprana, y la cantidad de gente joven que bebe mucho o con frecuencia es alarmante. Esto puede resultar en consecuencias muy serias de salud y bienestar. La iniciativa de *Liderazgo* está alertando a la Nación acerca de este problema crítico de salud pública y movilizándose en tomar acción para prevenirlo.

SOCIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

Fundadores de la Iniciativa
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
The Robert Wood Johnson Foundation

Socios que Aportan Fondos
Office of Research on Women's Health
National Center on Minority Health and Health Disparities
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
National Highway Traffic Safely Administration

Para mayor information visite
leadership@alcoholfreechildren.org

NIH Publication No. 99-4670
Updated May 2001